

IULIE - AUGUST 2025

CAMPANIE DE PROMOVARE A SĂNĂTĂȚII REPRODUCERII

Informează-te! Implică-te! Alege soluția potrivită pentru tine!



MINISTERUL
SĂNĂTĂȚII



Institutul
National de
Sănătate Publică

INFECȚIILE CU TRANSMITERE SEXUALĂ – PROBLEMĂ DE SĂNĂTATE PUBLICĂ

Anual, în UE sunt
notificate mai mult de

300.000

de cazuri de infecții cu
transmitere sexuală (ITS)

În UE, în 2023 comparativ cu 2022

Gonoree
96969

+31%

Sifilis
41051

+13%

Infecție cu Chlamydia
230199

+3%

MAJORITATEA ITS SUNT ÎNICIAL
ASIMPTOMATICE,

FAVORIZÂND TRANSMITEREA



ROMÂNIA, 2023

578 cazuri noi sifilis



sifilis latent: 59,9%

sifilis secundar: 24,6%



9,7% din cazuri
au fost depistate
la gravide

TINERII SUNT AFECTAȚI ÎNTR-O MĂSURĂ MAI MARE DE ITS

Foarte mulți tineri nu știu că sunt
infecțați pentru că frecvent, nu există
simptome îngrijorătoare inițial.

FACTORI CARE PUN TINERII LA RISC DE INFECȚII
CU TRANSMITERE SEXUALĂ

PARTENERI MULTIPLI

SCREENING INSUFICIENT

PROBLEME DE
CONFIDENȚIALITATE



Infecțiile cu
transmitere
sexuală pot fi
prevenite!

Screening-ul pentru
diagnosticarea
precoce a
persoanelor cu ITS și
a partenerilor lor
sexuali oferă cea
mai bună
oportunitate pentru
un tratament
eficient și pentru
prevenirea
complicațiilor și
transmiterii
ulterioare.

CARE SUNT METODELE DE PREVENIRE A INFECȚIILOR CU TRANSMITERE SEXUALĂ?

- ✓ ABSTINENȚA
- ✓ MONOGAMIA
- ✓ UTILIZAREA PREZERVATIVULUI
- ✓ TESTAREA PENTRU ITS
- ✓ VACCINAREA ÎMPOTRIVA HPV
- ✓ VACCINAREA ÎMPOTRIVA HEPATITEI B

Pentru a preveni răspândirea infecțiilor cu transmitere sexuală se
recomandă testarea pentru ITS.

Netratate, ITS pot
duce la consecințe
grave, inclusiv boli
neurologice și
cardiovasculare,
infertilitate, sarcină
extrauterină, nașcuți
morti și risc
crescut de infectare
cu HIV.



Anual, în lume, sunt
DIAGNOSTICATE
PESTE
600.000
cazuri.

RATA SUPRAVIETUIRII LA 5 ANI

DIAGNOSTIC
PRECOCE



DIAGNOSTIC
ÎN STADII AVANSATE



CINE ESTE LA RISC DE CANCER DE COL UTERIN?

Toate femeile, indiferent
de rasă/etnie sunt la risc
de a dezvolta cancer de
col uterin



CEL MAI FRECVENT SUNT
DIAGNOSTICATE FEMEI ÎN
VÂRSTĂ DE

35-44 ANI

CE CAUZEAZĂ CANCERUL DE COL UTERIN?

CEA MAI COMUNĂ CAUZĂ
HPV (HUMAN PAPILOMAVIRUS)



Peste 90% dintre cancerule
de col uterin sunt cauzate
de infecția cu HPV
Peste 80% din persoane se
infectează cu HPV în cursul
vieții, dar majoritatea nu
vor dezvolta cancer de col
uterin.

CARE SUNT SIMPTOMELE?

În mod obișnuit nu
există simptome în
stadiile precoce de
cancer de col uterin.

ODATĂ CE CANCERUL
AVANSEAZĂ

Simptomele pot include:

SÂNGERĂRI VAGINALE
ANORMALE

SCURGERI VAGINALE
ANORMALE

DURERE LA CONTACTUL
SEXUAL

DE CE ESTE SCREENING-UL CRUCIAL?

6 DIN **10**

CANCERE DE COL
UTERIN

SUNT DEPISTATE LA
FEMEI CARE NU AU
FĂCUT NICIODATĂ UN
TEST
BABEȘ-PAPANICOLAU
sau nu au fost testate în
ultimii 5 ani.